

登録番号	第20389号
農薬の種類	グリホサートイソプロピルアミン塩液剤
農薬の名称	マルガリーダ

製剤毒性	普
------	---

適用表

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草	雑草生育期(草丈30cm以下)但し、収穫14日前まで	250～500m l/10a	通常散布 100L/10a少量 散布25L/10a	数 2回 以内	雑草茎 葉散布	3回以内
		多年生雑草		500～1000m l/10a				
水田作物(水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	250～500m l/10a	25～100L/10a	1回		1回
		多年生雑草		500～1000m l/10a				
水田作物、畑作物(休耕地)	休耕地	一年生雑草	雑草生育期(草丈50cm以下)	250～500m l/10a	通常散布50～100L/10a少量 散布25～50L/10a	2回 以内		3回以内
水田作物(水稲を除く)、移植水稲、 直播水稲	-		雑草生育期但し、耕起20～10日前まで	250～500m l/10a	100L/10a	1回		2回以内
麦類(小麦を除く)			雑草生育期但し、耕起7日前まで	250～500m l/10a				3回以内
小麦		多年生休 科雑草	雑草生育期(草丈30cm以下)但し、耕起前又はは種前まで	250～1000m l/10a	25～100L/10a	3回 以内		
		一年生雑草		250～500m l/10a				
				250～500m l/10a				
		多年生雑草	雑草生育期(草丈30cm以下)但し、耕起7日前まで	500～1000m l/10a	100L/10a	1回		
	圃場内の 周縁部	一年生雑草	雑草生育期但し、収	250m l/10a	25～100L/10a	3回 以内		

			種7日前まで					
果樹類(かんきつ、キウイフルーツ、パイナップルを除く)	-	多年生雑草	雑草生育期(草丈30cm以下)但し、収穫7日前まで	250~500m l / 10a	通常散布50~100L/10a少量 散布25~50L/10a			
かんきつ		一年生雑草		250~500m l / 10a				5回以内
		多年生雑草		500~1000m l / 10a				
豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)		一年生雑草	雑草生育期但し、は種7日前まで	250~500m l / 10a		2回以内		2回以内
だいず			雑草生育期(草丈30cm以下)但し、は種後出芽前まで	250~500m l / 10a				4回以内
			雑草生育期但し、は種7日前まで	250~500m l / 10a				
えだまめ				250~500m l / 10a		1回		3回以内
かんしょ			雑草生育期但し、耕起又は挿苗7日前まで	250~500m l / 10a	100L/10a			2回以内
野菜類(えだまめ、キャベツ、はつかだいこん、だいこん、とうがらし類、にんじん、ピーマン、ねぎ、たまねぎ、アスパラガス、オリーブ(葉)、きゅうり、しゃくやく(薬用)、たらんぎ、トマト、なす、びわ(葉)、ほうれんそう、レタス、薬用にんじんを除く)			雑草生育期但し、耕起又は定植7日前まで	250~500m l / 10a	通常散布50~100L/10a少量 散布25~50L/10a			1回
だいこん			雑草生育期但し、耕起又はは種7日前まで	250~500m l / 10a	100L/10a			2回以内
キャベツ			雑草生育期但し、耕起又は定植7日前まで	250~500m l / 10a				1回
ねぎ、たまねぎ				250~500m l / 10a	通常散布50~100L/10a少量 散布25~50L/10a	3回以内		3回以内
			雑草生育期(定植後畦間処理)但し、収穫30日前まで	250~500m l / 10a				
とうがらし類、にんじん、ピーマン			雑草生育期但し、耕			1回		2回以内

			起又は定植7日前まで	250～500m l / 10a				
アスパラガス、オリーブ(葉)、きゅうり、しゃくやく(薬用)、たらのぎ、トマト、なす、びわ(葉)、ほうれんそう、レタス				250～500m l / 10a				3回以内
薬用ニンジン				250～500m l / 10a				10回以内(1年間に2回以内)
はつかだいこん			雑草生育期但し、耕起又はは種7日前まで	250～500m l / 10a	100L/10a			1回
さとうきび(春植え)			雑草生育期但し、耕起10日前まで	250～500m l / 10a	通常散布50～100L/10a少量散布25～50L/10a			6回以内
		多年生雑草		500～1000m l / 10a				
茶		一年生雑草	雑草生育期 但し、摘採7日前まで	250～500m l / 10a	少量散布25～50L/10a			2回以内
樹木類			雑草生育期	250～500m l / 10a	通常散布50～100L/10a少量散布25～50L/10a	4回以内		4回以内
牧草	牧野、草地(更新・造成)		雑草生育期 但し、更新・造成の10日前まで	250～500m l / 10a	50L/10a	2回以内		3回以内
		多年生雑草		500～1000m l / 10a				
		一年生及び多年生雑草	耕起整地後:雑草発生揃期は種10日前～は種当日	250～500m l / 10a	少量散布25～50L/10a			
樹木等	公園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	一年生雑草	雑草生育期	500m l / 10a	通常散布100L/10a少量散布25L/10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	
		多年生雑草		1000m l / 10a				
		スギナ	生育盛期	2000m l / 10a	少量散布25～50L/10a			
林木	造林地(地ごしらえ)	スギ、ササ類、スギ等の多年生雑草、落葉雑草、かん木	生育盛期以降	1000m l / 10a	20～30L/10a		雑草木茎葉散布	

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
-----	------	-------	------	------	------	---------	------	-------------------

樹木等	公園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	雑かん木	伐採直後	原液又は2倍液	切り口全体に十分量を塗布	-	植栽地を除く樹木等の周辺地に切株塗布処理	-
林木	林地	落葉雑かん木	5~10月	原液又は2倍液	1m ³ /ヶ所、樹径ヶ所数、10cm以下 2~3、10~20cm 4~8、20cm以上 10		立木注入処理	
				原液又は2倍液				
		クマ	春期又は秋期	原液又は2倍液	1~2m ³ /株			
畑作物	林地、放置竹林、畑地	竹類	夏~秋期	原液	5~15m ³ /本		竹稈注入処理	
				原液				

<免責事項>

独立行政法人農林水産消費安全技術センターは利用者が当ホームページの情報をを用いて行う一切の行為について何ら責任を負うものではありません。

農薬の使用や防除指導等に際しては、農薬のラベルを必ずご確認ください。